


ස්ත්‍රීන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ එහි සෞඛ්‍යමය බලපෑම



DR (MRS) N. MAPITIGAMA
CONSULTANT COMMUNITY PHYSICIAN
PROGRAMME MANAGER FOR GENDER
AND WOMEN'S HEALTH
FAMILY HEALTH BUREAU
MINISTRY OF HEALTH

ස්ත්‍රීන්ට ඵරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සෞඛ්‍යමය ගැටළුවක්ද?

- ස්ත්‍රීන්ට ඵරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය මුළු ලොවටම පොදුවූ ප්‍රශ්නයකි.
- එය වච්ච සංස්කෘතික, සමාජීය, භූගෝලීය, ආගමික හා ආර්ථික ස්ථර පුරා පැතිරී ඇත.
- මානව හිමිකම් පිළිබඳ ගැටළුවකි.
- මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් බව හඳුනාගෙන ඇත.



ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය
ලොව පුරා ප්‍රචලිත බවට සාක්ෂි



ස්ත්‍රීන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය සැලවුණු, ලෝකය පුරා ප්‍රචලිත සෞඛ්‍යමය ගැටළුවකි.

- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ, සෑම වසරකදීම මිලියන 2.4 ක් කාන්තාවන් හිංසනයට හා පහරදීමට ලක් වන අතර, ප්‍රජනක වයසෙහි සිටින කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන්ම අනතුරු වලට ලක්වන හේතුවද මෙයවේ.
- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ 28% ක් හා එංගලන්තයේ 25% ක් කාන්තාවන් (තම ජීවිත කාලය තුළ) එක් වතාවක් හෝ තම සහකරුගෙන් හිංසනයට ලක් වී ඇත. (UNICEF 2000)
- එංගලන්තයේ වසරක් පාසා කාන්තාවන් 10 කගෙන් එක් අයෙක් බරපතල ලෙස තම පුරුෂයාගෙන් හිංසනයට හා පහර කෑමට ලක් වන අතර, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සෑම තත්පර 15 කට වරක් කාන්තාවක් තම සහකරුගේ පහරදීම් වලට ලක් වේ. (Epstein 1998)

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය මගින් අන්තර්ජාතිකව සිදු කරන ලද සමීක්ෂණය


24000 ක් කාන්තාවන් සහභාගි කරවා ගන්නා ලද අතර පහත සඳහන් රටවල් 10 යේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කරන ලදී.

- ඩංගලාදේශය
- ඩුසිලය
- ඉතියෝපියාව
- ජපානය
- ජේරු රාජ්‍යය
- නැමිබියාව
- සැමෝවා රාජ්‍යය
- සර්බියාව
- තායිලන්තය
- ටැන්සානියාව


මෙම අධ්‍යයනයේ අරමුණ

- සහකරු මගින් සිදුවන හිංසනයෙන් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරවන්නාවූ කරුණු හා වඩ වඩාත් හිංසනයට ලක් වීමට හේතුවන කරුණු හඳුනා ගැනීම.
- ගාරීරීක, ලිංගික හා මානසික හිංසනයෙහි ව්‍යාප්තිය නිර්ණය කිරීම. මෙහිදී සහකරු මගින් සිදුවන හිංසනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇත.
- සහකරු මගින් සිදුවන හිංසනය හේතුවෙන් මතුවන සෞඛ්‍යමය ගැටළු අධ්‍යයනය කිරීම.

සහකරු මගින් සිදුවන්නා වූ ශාරීරික/ලිංගික හිංසනයේ ප්‍රවණතාවය (WHO, 2004)




සහකරු මගින් තදබල ශාරීරික හිංසනයන් ඇති වීමේ ප්‍රවණතාවය (WHO, 2004)



Dr N M

අයහපත් සෞඛ්‍යය තත්වයන් වාර්තා කරන්නාවූ කාන්තාවන් ප්‍රතිශතය හා ශාරීරික හිංසනය වාර්තා කරනු කාන්තාවන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය

Proportion of women reporting poor health and association with reported violence




හිංසනය සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇති කරන්නාවූ අවදානම් සහගත කරැණුකි


- අපයෝජනයට ලක් නොවූ කාන්තාවන් හා සැසඳීමේදී ඊට ගොදුරු වූ කාන්තාවන් පහත ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි
 - වඩාත් වැඩි රෝග ලක්ෂණ
 - ක්‍රියාකාරීත්වයේ දුබලතාවයන් (අඩාල වීම හා හිඟ වීම)
 - වඩා අහයපත් සෞඛ්‍ය තත්වයන්
 - සෞඛ්‍යය සේවාවන් වැඩි වශයෙන් භාවිතා කිරීම
 - විවිධාකාරවූ රෝග තත්වයන් හදුනා ගැනීම
- අපයෝජනයෙහි බරපතල බව රෝග ලක්ෂණයන්හි බරපතල බවින් පිළිඹිබු කරයි.

බාර්බික හිංසනය හා සිය දිවි හානිකර ගැනීමේ අදහස අතර ඇති සම්බන්ධතාවය

Violence and suicidal ideation



ගෞරවය හා ගෞරවය ඇති වීමේ ප්‍රවණතාවය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය



හිංසනය නිසා ගර්භණීභාවය මත ඇති වන අහිතකර බලපෑම්

1. යෝනි මාර්ගය හා ගැබ් ගෙල ආශ්‍රිත ආසාදනයන්
2. නොමේරු දරු උපන් (Pre mature Labour)
3. ගබ්සාවිම්
4. මළ දරු උපන්
5. ගර්භණී අවධියේ ඇතිවන රුධිර වහනය වීම්
6. අඩු බර උපන් (Low birth weight)
7. පුර්ව ගර්භණී හා ගර්භණී සෞඛ්‍යය සේවාවන් (මාතෘ සෞඛ්‍යය සේවාවන්) නියමිත කලට ලබා නොගැනීම.



හිංසනය නිසා වෙනත් නාරිවේදී ගැටළු ඇතිවේ

ලිංගික හිංසනයට ලක්වූ විට පහත ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි


- යෝනි මාර්ගයෙන් රුධිරය වහනය වීම
- යෝනි මාර්ගයෙන් ශ්‍රාවයන් පිට වීම
- මාස් ශුද්ධයේදී අධික වේදනාව
- ලිංගික ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වීම (අඩපණ වීම, බෙලහින වීම)
- ප්‍රජනක පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග තත්ව (PID)
- උදරය/යට් බඩෙහි ඇතිවන දීර්ඝකාලීන වේදනාව

ඉහත සමීක්ෂණයට අනුව


- ලෝකය පුරා සෑම කාන්තාවන් තිදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක්, තම සහකරු අතින් පහර කෑමට, ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වේ.
- ගාරීරීක හා ලිංගික අපයෝජනය, කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය තත්වයේ පිරිහීමට හා ගාරීරීක දුබලතා(බෙලහිනතාවයන්) සදහා ප්‍රධාන සාධකයක්වේ

හිංසනය, ශාරීරික දුබලතාවයන්ට හා මරණයට ප්‍රධාන සාධකයකි

වයස 15-44 අතර කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යය කෙරෙහි බලපාන්නාවූ තෝරාගත් අවදානම් සහගත තත්වයන්



සහකරුගේ සිදුවන හිංසනය සහකාරියගේ ජීවිතය වනාහ කිරීමට සාධකයක් විය හැක.



ශ්‍රී ලංකාවේ කරන ලද අධ්‍යයනයන්ට අනුව
හිංසනයේ වර්තමාන තත්වය



ශ්‍රී ලංකාවේ කරන ලද අධ්‍යයනයන්ට අනුව හිංසනයේ වර්තමාන තත්වය

කාන්තාවන්ට අත්විඳින්නට සිදු වන හිංසනයන් සෑම ප්‍රදේශයකින්ම,
සෑම සමාජ ස්ථරයකින්ම හා සියලු ජාතින්ට අයත් පුද්ගලයින්
අතරින් වාර්තා වේ.

- හිංසනයට ලක් වන්නාවූ බොහෝ ස්ත්‍රීන් වයස අවු. 20-44 අතර වේ.
- එම හිංසනයන් සිදු කරන්නේ ස්වාමියා, නෑදෑයින්, අසල්වාසීන් හා
වෙනත් සම්පතමයන් විසිනි.

2006 වර්ෂයේදී කරනු ලද සමීක්ෂණයක්

- ඛණ්ඩාංක ප්‍රදාන කාර්යාලයේ නම සහකරුවන්
හිංසනයට ලක් වීමේ ප්‍රවණතාවය
- වයස 18 - 49 ට අතර විවාහක කාර්යාලය
- 750 ක සාම්පලයක්
- ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සමීක්ෂණය සඳහා යොදා
ගන්නා ලද ප්‍රශ්නාවලියම (WHO
questionnaire) යොදා ගන්නා ලදී.

සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල

- තම ජීවිත කාලය තුළදී ගාරිඊකව හිංසනයට ලක් වීමේ ප්‍රවණතාවය 34.4% ක් වේ.
- පසු ගිය වසර තුළදී ගාරිඊකව හිංසනයට ලක් වීමේ ප්‍රවණතාවය 8.8% ක් වේ.
- තම ජීවිත කාලය තුළදී ඉතාම බරපතල ලෙස ගාරිඊකව හිංසනයට ලක් වීමට ඇති ප්‍රවණතාවය 19.8% ක් වේ.

ස්ත්‍රීන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය නිසා ඇතිවන සෞඛ්‍යමය ගැටළු

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය

මාරාන්තික ප්‍රතිඵල

- මනි මැරීම
- සියදිව නසා ගැනීම
- මාතෘ මරණ
- AIDS ආසාදන හා ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න

මාරාන්තික නොවන ප්‍රතිඵල

- දිගුකාලීනව පවතින සෞඛ්‍ය ගැටලු
- Chronic pain
 - ආන්ත්‍රික ආබාධ
 - Fibromialgia
 - මහක ශක්තිය දුර්වල වීම හා මහකය වෙනස් වීම

- ගැටිලි සෞඛ්‍යයට හානිකර පුරුදු/ ඇබ්බැහිවීම්
- දුම් පානය මත්පැන් /මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතය
 - අනාරක්ෂිත ලිංගික කැසිටීම
 - මානසික පීඩනය නිසා කය නොවෙහෙසීම (Physical inactivity)
 - ආහාර ගැනීමේ අසාමාන්‍යතා

- මානසික
- PTSD
 - චගාදය Depression
 - සංකාම Anxiety
 - බිය Phobia /Panic disorders

- පුජනක සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටළු
- අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම
 - HIV /AIDS /STI
 - නාර්වේදීය ගැටලු
(යෝනි මාර්ගයෙන් රුධිරය වහනය වීම, යෝනි මාර්ගයෙන් දුගඳ ඇති ශ්‍රාවයන් පිට වීම, ඔසප් කාලයේදී ඇති වන වේදනාවන්, ලිංගික බෙලහිනත්වය, ශ්‍රෝනියේ වේදනාවන්)
 - අනාරක්ෂිත ගබ්සාවන් ගර්භනී අවධියේ සංකුලනා/LBW
 - PID

- ගැටිලික
- තුවාල (සිරිම/ හග්න/----)
 - අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ට හානිවීම
 - ස්ථිර ආබාධිත තත්වයන්
 - තම සෞඛ්‍ය පිරිහීම
 - ඵදිනෙදා කටයුතු කරගැනීමට අපහසු වීම
 - කරකැවිල්ල

මැදිහත් වීම

බහු ආයතනික පිවිසුමක්
අවශ්‍යයි.

සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ වගකීම



A photograph of two yellow-rumped flycatchers (Tijer) on a nest. The nest is constructed from a messy pile of dry twigs and sticks. One bird is perched on the upper right side of the nest, facing left. The other bird is on the lower left side, also facing left. Both birds have grey bodies with a prominent yellow stripe running from the forehead down the side of the body. The background is filled with green foliage, including large, rounded leaves and some moss. The overall scene is a close-up of the birds in their natural nesting environment.

සීනුතිරිය