

Instruction on how to collect a sample of Urine for culture

1. Collect a sterile container from the laboratory.
2. Wash your hands thoroughly with soap and water before starting the collection process.
3. Cleanse the genital area with a moist, soapy wash cloth to remove any potential contaminants.
4. Start urinating into the toilet or urinal hold the urine collection container in the midstream urine to collect about 30-60 milliliters (1-2 ounces). Ensure the container does not touch your skin.
5. Immediately cap the container tightly to prevent spillage and contamination.
6. Deliver the urine sample to the laboratory as soon as possible. If you cannot deliver the sample to the laboratory immediately, store it in the refrigerator to prevent bacterial growth. However, do not freeze the sample.

රෝපිත මතු පරීක්ෂණයක් සඳහා මතු සාම්පූර්ණ බ්‍රාගන්නා පිළිවෙල

- (1) විෂබේද නසන ලද හාජේනයක් රසායනාගාරයෙන් බ්‍රාගන්න.
- (2) මතු සාම්පූර්ණ බ්‍රා ගැනීමට පෙර දැන් සඩන් හා ජලය යොදා සේදා පිරිසිදු කරන්න.
- (3) ඔබගේ ලිංගික ප්‍රදේශය සඩන් හා ජලය යොදා සේදා පිරිසිදු තවායකින් පිස දමා විෂබේද හරණය කරන්න.
- (4) මතු මදක් යැමට සලස්වා මතු ප්‍රවාහයේ මද කොටසින් මතු ප්‍රමාණයක් රසායනාගාරයෙන් බ්‍රාගන් හාජේනයට එකතු කරගන්න. හාජේනය හමේ තොවදින ලෙස සාම්පූර්ණ (30-60 ml) එකතු කරගැනීමට වග බලා ගන්න.
- (5) මතු එකතු කරගත් විශේෂම මතු එකතු කරගත් හාජේනය වාතයට නිරාවරණය වීම වැලැක්වීමට පියනෙන් වසා සිල් කරන්න.
- (6) බ්‍රාගත් සාම්පූර්ණ පැයක් ඇතුළත රසායනාගාරයට ගෙනැවින් හාර දෙන්න. යම් හෙයකින් සාම්පූර්ණ රසායනාලාරය වෙත ගෙනැවින් දීමට පැයකට වැඩි කාලයක් ගත වන්නේ හම් සාම්පූර්ණ අයිස් වල දමා ගෙනැවින් දෙන්න.