

භාහිකර අවස්ථා :

රුධිරයේ ලිතියම් ප්‍රමාණය යම් අගයකට වඩා වැඩිවූ විට පහත සඳහන් තත්ත්ව උදාවිය හැක. එවිට වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවීම වැදගත්වේ.

- වමනය
- උදරයේ වේදනාව හා පාවනය
- අධිකව ඇගිලි වෙවිලීම
- කටාව අපැහැදිලි වීම
- ගාර්ථික අප්‍රාණික භාවය
- මුත්‍රායාම අඩුවීම
- අධික නිදිමත හා කැරකිල්ල
- මස්පිඬු දැහලීම, වේදනාව හා දුබල බව
- ඇවිදීමේ අපහසුතාවය
- දෘෂ්ඨි දුබලතා (බොදව් පෙනීම)
- අපස්මාරය හා අසිතිය

ලිතියම් නිසා ඇතිවිය හැකි භාහිකර අවස්ථා වැලැක්වීම සඳහා ඔබට ගතහැකි පියවර

- පාවනය, වමනය, උණ හා විෂලනය ඇති අවස්ථා වලදී වහාම ලිතියම් ගැනීම නවතා හැකි ඉක්මනින් ඔබේ වෛද්‍යවරයා හමුවී ලිතියම් මාත්‍රාව ගැන උපදෙස් ලබාගන්න.
- යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඔබ ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය, මුත්‍ර හා දියර ප්‍රමාණය අඩුකරන්නේ නම් ඊට පෙර ඒ බව වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්න.
- හැකි පමණ දියර වැඩිපුර පානය කරන්න.

- වෙනත් රෝගයක් සඳහා වෛද්‍යවරයකු හමුවන විට ඔබ ලිතියම් ඖෂධය ගන්නා බව පවසන්න. සමහර ප්‍රතිජීවක, වේදනා නාශක හා අධිරුධිර පීඩනයට දෙනු ලබන ඖෂධ මගින් රුධිරයේ ලිතියම් ප්‍රමාණය වැඩිවිය හැක.
- ඔබ භාවිතා කරන සෑම ඖෂධයක් ගැනම ඔබේ මනෝ වෛද්‍යවරයාට දැන්වන්න.

ලිතියම් රුධිරයේ වැඩිවීම නිසා ඇතිවන භාහිකර ආබාධ දැණුණු වහාම ඔබට ගතහැකි පියවර

- එවෙලේම ලිතියම් ගැනීම නවතන්න.
- හැකි පමණ දියර පානය කරන්න.
- වහාම ඔබේ මනෝ වෛද්‍යවරයා හමුවන්න.



සැකසුම

ශ්‍රී ලංකා මනෝවෛද්‍ය සංගමය
 "විජේරාම හවුස්"
 නො. 06, විජේරාම මාවත,
 කොළඹ 07.



අනුග්‍රහය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය,
 ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය,
 නො. 226, බොද්දාලෝක මාවත,
 කොළඹ 07.



Information for Patients on

ලිතියම්



ලිතියම් ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ

ලිතියම් යනු මනෝ වෛද්‍යවරයකු විසින් විශාදය ආදී මානසික රෝග සඳහා (Depression, Bipolar Affective Disorder) භාවිතා කරන විශේෂ ඖෂධ වර්ගයකි.

ලිතියම්

- ඉහත රෝග තත්ත්ව සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙසද නැවත එම රෝග තත්ත්වය මතුවීම වැළැක්වීම සඳහාද දෙනු ලැබේ.
- විශාදය වැනි රෝගී අවස්ථා වලදී සියදිවි නාතිකර ගැනීමේ අවදානම අඩුකරයි.
- කෙනෙකුගේ කලහකාරී / ආවේගශීලී හැසිරීම් හා තම ගරීරයට තුවාල සිදුකරගැනීමේ හැසිරීම් ඊටා පාලනය කරගැනීම සඳහාද භාවිතා කෙරේ.

ලිතියම් භාවිතයේදී ඔබ පිළිපැදිය යුතු කරුණු

- වෛද්‍යවරයා විසින් ඔබගේ රෝග ස්වභාවය හා ගරීරයේ ඇති ලිතියම් ප්‍රමාණය අනුව අවශ්‍ය ඖෂධ මාත්‍රාව තීරණය කරනු ලබයි.
- සෑමවිටම වෛද්‍යවරයා හිසම කරන මාත්‍රාව පමණක් ගන්න.
- එක් වේලක් මගහැරුණු නිසා ලිතියම් මාත්‍රාව වැඩිකර ගැනීමෙන් වලකින්න.
- වෛද්‍ය අවවාදයෙන් තොරව හදිසියේ ලිතියම් ගැනීම නතර නොකරන්න

පහත අවස්ථාවලදී ලිතියම් භාවිතය නුසුදුසු බැවින් ඒ බව දැනගත් වහාම වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දෙන්න.

- වකුගඩු ආබාධ ඇතිවීම
- හෘදයාබාධ ඇතිවීම
- ගැබ්ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින විට
- මව්කිරි දෙන විට

ලිතියම් ප්‍රතිකාරය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ඔබගේ වෛද්‍යවරයා පහත සඳහන් පරීක්ෂණ කිරීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලබයි.

- වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය (Renal functions)
- තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරීත්වය (Thyroid functions)
- හෘදවස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය (ECG)

ඔබ ලිතියම් ප්‍රතිකාරය ලබාගන්නා අතර මාස 6 කට වරක් පහත පරීක්ෂණ කරගැනීමට ඔබට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

- වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය (Renal functions)
- තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරීත්වය (Thyroid functions)
- රුධිරයේ ලිතියම් ප්‍රමාණය (Serum Lithium levels)

රුධිරයේ ඇති ලිතියම් ප්‍රමාණය මනින පරීක්ෂණයේදී ඔබ පිළිපැදිය යුතු කරුණු

- ඔබ රාත්‍රියේ ලිතියම් මාත්‍රාව ගැනීමෙන් පැය 12 කට පසුව රුධිර සාම්පලය ගත යුතුයි.

- ඔබ උදේටත් ලිතියම් භාවිතා කරන්නේනම් රුධිර සාම්පලය ගන්නාතෙක් එම වේල පමා කල යුතුයි.
- ලිතියම් පරීක්ෂණයේදී ඔබ නිරාහාරව සිටිය යුතු නැත.
- පරීක්ෂණයට පෙර සතියක්වත් සෑම දිනකම එකම වෙලාවට ලිතියම් මාත්‍රාව ගත යුතුයි.
- ලිතියම් ප්‍රතිකාරය ආරම්භ කිරීමෙන් දවස් 5-7 අතරතුරදී ලිතියම් පරීක්ෂණය වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි කළ යුතුයි.
- ආරක්ෂිත ලිතියම් භාවිතයක් සඳහා මාස 6කට වරක් රුධිර ලිතියම් සාන්ද්‍රණය පරීක්ෂා කරගත යුතුයි.

ලිතියම් නිසා ඇතිවන අතුරු ආබාධ

රුධිරයේ ඇති ලිතියම් ප්‍රමාණයේ අඩුවැඩිවීම අනුව එමගින් ඇතිවන අතුරු ආබාධ ප්‍රමාණයද වෙනස් වේ.

අතුරු ආබාධ :

සමහරකුට පමණක් අතුරු ආබාධ ඇතිවන අතර ඒවාද තාවකාලික වේ. නමුත් වෛද්‍යවරයාට ඒ බව පවසා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.

- ආමාගයිය අපහසුතා
- ඔක්කාරය සහ ලෝහමය රසය
- ඇතිලි වෙව්ලීම
- වතුර පිපාසය
- අධිකව මුත්‍රා පිටවීම
- ගරීරයේ බර වැඩිවීම
- කුරුලෑ, සොරැසිස් (Psoriasis) ආදී හමේ රෝග තත්ත්ව උග්‍රවීම
- තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ආබාධ